



# ZINC 75

**FERTILIZANTE FOLIAR**

**DESCRIPCIÓN:**

ZINC 75 formulado en función de los ligandos de los complejos lactatos, se obtiene un balance equilibrado dentro de un estado floable, cuya acción es proporcionar fuerzas el ion zinc en alta concentración, esto hace más eficaz la absorción y traslocación corrigiendo el déficit de zinc.

**COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/v**

Zinc (ZnO) .....	75%
------------------	-----

**BENEFICIOS:**

- Aporte de zinc para corregir deficiencias y para ser aplicado en pulverizadores directos al cultivo, de fácil asimilación y traslocabilidad para aplicarse en tratamiento de cuajado de frutos. Desarrollo y crecimiento vegetativo.

FORMULADO POR: Raúl Yaipén Lab.

RUC: 20608260693

DURACIÓN: 3 años

DENSIDAD: 1.80 - 1.85 g/mL

PH 1%: 8.4

**DOSIS Y APLICACIONES:**

CULTIVOS	DOSIS / 200L AGUA	DOSIS / ha	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Vid	0.50 - 0.75L	3 - 4L	Aplicar desde el brote de 40 cm y repetir a días de la floración.
Espárrago	0.50L	2 - 3L	Al trasplante, e inicio del crecimiento vegetativo hasta 90 días en intervalos de 20 días.

Tomate, ají, páprika y pimienta	0.25 - 0.5L	2 - 3L	Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 15 a 20 días hasta la fructificación. Aplicar 2 veces.
Frutales: Mango, palto, lúcumo y manzano	1.0L	3 - 4L	Al rebrote de hojas, en prefloración, al cuajado y al crecimiento del fruto.
Cebolla y ajo	0.25 - 0.50L	2 - 3L	A los 20 días de emergencia repetir cada 15 días hasta el crecimiento del bulbo.
Cítricos: Mandarina, toronja, limón y naranja	1 - 2L	3 - 4L	En crecimiento vegetativo, repetir cada 20 días hasta el crecimiento del fruto.
Blueberries y fresa	1.0 - 1.5L	2 - 3L	Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el crecimiento del fruto.
Alcachofa	0.5 - 1L	2 - 3L	En el crecimiento vegetativo. Repetir 2 veces.
Algodón	1 - 2L	3 - 4L	Después del desahije, otra en prefloración e inicio de botones de bellota.
Girasol y maíz	0.5 - 1L	2 - 3L	Hacer 2 aplicaciones antes de la floración.
Hortalizas: nabo, zanahoria, poro y col	0.5 - 1.0L	2.5L	A los 20 días después de la emergencia y repetir otra a los 15 días.
Leguminosas: Soja, habas, lentejas y garbanzo	1.0L	2 - 3L	Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración y otra en formación de vaina.
Papa, olluco, yuca y oca	0.75 L	2 - 3L	Después del aporque, repetir cada 20 días hasta el llenado del tubérculo.
Curcubitáceas: zapallo, melón y sandía	0.5 - 1.0 L	2 - 3L	Aplicar en crecimiento vegetativo después del cuajado del fruto 2 a 3 veces.
Arroz, coca, quinua, café y cacao	1 - 2 L	3 - 4L	Durante toda la campaña.