

ECOAMIN 30

AMINOÁCIDO Y PROTEINATOS

DESCRIPCIÓN:

ECOAMIN 30 es un concentrado de aminoácidos de rápida asimilación formulado a base de L- α -aminoácidos activados obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas. Funciona como un bioestimulante de alta disponibilidad para lograr una mayor movilidad de los nutrientes y estimular un aumento en la capacidad del sistema radicular y biomasa foliar.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/v

Aminoácidos totales..... 30%
Nitrógeno (N)..... 4%

Lisina	1.94%	Metionina	0.82%	Arginina	1.65%
Histidina	1.75%	Fenilalanina	1.74%	Ácido glutámico	1.62%
Ácido aspártico	2.8%	Leucina	1.29%	Treonina	1.76%
Prolina	3.92%	Isoleucina	1.36%	Serina	1.85%
Glicina	1.55%	Tirosina	0.65%	Alanina	2.74%
Cisteína	2.9%	Valina	1.42%		

BENEFICIOS:

- Puede ser aplicado al suelo para estimular una brotación uniforme de raíces aumentando la masa radicular y/o en aplicaciones foliares para proveer los nutrientes y la energía necesaria para activar la brotación uniforme de las yemas foliares y florales.
- Provee los nutrientes y la energía necesaria para ayudar a las plantas a mejorar el movimiento de los carbohidratos y proteínas por lo que estimula el crecimiento.

FORMULADO POR: Raúl Yaipén Lab.

RUC: 20608260693

ORIGEN: Perú

DURACIÓN: 3 años

PH 100%: 5.5 - 6.5

DENSIDAD: 1.12 – 1.15 g/mL

DOSIS Y APLICACIONES:

CULTIVOS	DOSIS / 200L AGUA	DOSIS / HA	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Vid	2.5L	4 – 5 L	Aplicar desde el brote y repetir cada 20 días hasta el crecimiento del racimo.
Espárrago	2.5L	4 – 5L	Al trasplante e inicio del crecimiento vegetativo hasta 90 días en intervalos de 20 días.
Tomate, ají, páprika y pimiento	2 – 2.5L	3 – 4L	Desde el crecimiento hasta la floración, repetir cada 15 a 20 días hasta la fructificación y aplicar 2 veces.
Frutales: Mango, palto, lúcumo y manzano	3.5L	5 – 6L	Al rebrote de hojas, en prefloración al cuajado y al crecimiento del fruto.
Cebolla y ajo	2.5 – 2.75L	3.5 – 4L	A los 20 días de emergencia repetir cada 15 días hasta el crecimiento del bulbo.
Cítricos: Mandarina, toronja, limón y naranja	3.75 – 4L	5 – 6L	Al inicio de floración, repetir cada 20 días hasta el crecimiento del fruto.
Blueberries y fresa	1.5 – 1.75L	2.5 – 3L	Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el crecimiento del fruto.
Alcachofa, maracuyá y granada	1.75 – 2L	3 – 4L	En el crecimiento vegetativo y repetir 2 veces.
Algodón	1.5 – 2L	3 – 4L	Después del desahije, otra en prefloración e inicio de botones de bellota.
Girasol y maíz	1.75 – 2L	3 – 4L	Hacer 2 aplicaciones antes de la floración.
Hortalizas: nabo, zanahoria, poro y col	1.25 – 2L	3L	A los 20 días después de la emergencia y repetir otra a los 15 días.
Leguminosas: Soja, habas, lentejas y garbanzo	0.50 – 0.75L	1.5 – 2L	Inicio de tres hojas verdaderas, en prefloración y otra en formación de vaina.
Papa, olluco, yuca y oca	1L	2 – 3L	Después del aporque, repetir cada 20 días hasta el llenado del tubérculo.
Curcubitáceas: zapallo, melón y sandía	1 – 1.5L	2 – 3L	Aplicar en prefloración y después del cuajado del fruto 2 a 3 veces.
Arroz, coca, quinua, café y cacao	2 – 3L	4 – 5L	Durante toda la campaña.



FICHA TÉCNICA

Teléfono: +51 991 911 988
contacto@raulyaipen.com